



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

e-mail dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it P.I. 00243570694

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

F.A.Q. 1 e 2

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, CAT. C DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI)

Domanda 1 : Basta il messaggio sul telefonino o la mail di risposta della ASL, a seguito di un tampone effettuato in occasione di uno screening di massa o al drive-in ?

Risposta 1 :

Non basta il messaggio sul telefonino o la mail di risposta della ASL se privi di referto .

Il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (DFP-0007293-P-03/02/2021), al punto 3 sub 4 testualmente recita :

4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; .

Il termine **referto** indica nel linguaggio giuridico, una relazione scritta rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale..... .

Da informazioni assunte presso la ASL territorialmente competente, chi si sottopone al test presso il drive-in può chiedere al medico presente in loco, il rilascio del referto, che potrà avvenire in forma diretta o indiretta tramite il medico di famiglia, l'importante che **sia una relazione scritta, rilasciata da un medico, relativa ad un test antigenico rapido o molecolare.**

Domanda 2 : Ho fatto il vaccino, devo presentare il referto del test antigenico rapido? Oppure basta l'attestazione di avvenuta vaccinazione?

Risposta 2 :

Si ritiene necessario presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Dalle note informative dei vari vaccini in fase di somministrazione, si evidenzia che :

- Per il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19", possono essere necessari **fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino** per sviluppare la protezione contro il COVID-19. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. **Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del**

vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 .

- Per il vaccino “**COVID-19 Vaccine Moderna**”, possono essere necessari **fino a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino** per sviluppare la protezione contro il COVID-19. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. **Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.**
- Per il vaccino “**COVID-19 Vaccine AstraZeneca**” La protezione inizia da circa **3 settimane dopo la prima dose** di “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”. I vaccinati potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 59,5% e potrebbe essere inferiore in persone con comorbidità e problemi immunitari. **Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.**

FAQ rilasciate il giorno 15/03/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
ROC

Maurizio Aquilano

Firma autografa sostituita dall’indicazione del
nominativo del funzionario responsabile.
(art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

